

FARM Closemasti

Gelis su chlorheksidinu spenių sveikatinimui ir higienai palaikyti, naudojamas po melžimo – dezinfekantas.

FARM Closemasti – paruoštas naudojimui dezinfekuojantis gelis su chlorheksidinu ir mėtų ekstraktu, skirtas melžiamų gyvūnų tešmens priežiūrai ir spenių kanalėlių uždarymui. Papildomos medžiagos apsaugo jautrią spenių odą: ji išlieka minkšta. Vilgant – barjeras saugo spenį ir jo kanalėlį nuo neigiamo aplinkos poveikio, hiperkeratozės sukėlėjų ir kt. neigiamų mikroorganizmų. Labai teigiamai veikia pažeistus spenius. Dezinfekuojamoji priemonė yra klampi, ekonomiška.

FARM Closemasti:

- valymo ir dezinfekavimo produktas, skirtas karvių speniams;
- aušinamasis poveikis;
- sudaro gerai matomą plėvelę ant spenio ir uždaro angelę nuo aplinkoje esančių mastito patogenų;
- optimali formulė ir efektyvumas prieš hiperkeratozės ir kt. mikroorganizmus;
- ilgesnis odos puoselėjimas;
- puikus kvapas.

Produkto sudėtis

Chlorheksidinas, glicerinas, plėvelę formuojanti medžiaga, klampumą reguliuojanti medžiaga ir mėtų ekstraktas.

Naudojimo instrukcija

Naudoti vilgiklį kambario temperatūros. Įpilti į spenių mirkymo indelį. Iškart po melžimo suvilgyti spenius (pamerkti į vilgiklį maždaug 2 – 5 cm arba visą spenį). Prieš kitą melžimą būtina nuskalauti ir nusausinti. Norma vienam produkto naudojimui: 3,5 – 4,5 g.

Paskirties gyvūnai

Karvės ir kiti melžiami gyvūnai.

Informacija apie saugų naudojimą

Įspėjimas: nepilti naudoto vilgiklio atgal į pakuotę. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti originalioje talpoje, sandariai uždarytas, vengti tiesioginių saulės spindulių bei staigių temperatūrinių režimų pokyčių. Sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip +5°C temperatūra ir ne aukštesnė kaip +25°C temperatūra.

Išlauka

Netaikoma išlauka.

Pakuotė

Užsukami 20 L bakeliai, 200 L statinė bei 1 m³ konteineriai.



Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną	Skystis, klampus
Spalva	Neskaidri, mėlyna
Kvapąs	Būdingas (mėtų)
pH, 100 %, 20-25°C	6,5 – 8,5
Santykiniš tankis, g/cm ³ , 20°C	1,00 – 1,03

Galiojimo laikas

Geriausias 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Mikrobiologinių tyrimų rezultatai

Tyrimai buvo atlikti pagal EN 1656:2009/AC:2010, EN 1657:2016 metodus.

Esant 100 % **FARM Closemasti** koncentracijai ir 30°C temperatūrai, nešvarioms sąlygoms (10 g/l nugiebtą pieno), kai ekspozicijos laikas: 0,5 minutės, baktericidiškai aktyvus (*Escherichia coli*, *Streptococcus uberis*).

Esant 100 % **FARM Closemasti** koncentracijai ir 30°C temperatūrai, nešvarioms sąlygoms (10 g/l nugiebtą pieno), kai ekspozicijos laikas: 5 minutės, baktericidiškai aktyvus (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*).

Esant 100 % **FARM Closemasti** koncentracijai ir 30°C temperatūrai, nešvarioms sąlygoms (10 g/l nugiebtą pieno), kai ekspozicijos laikas: 5 minutės, fungicidiškai aktyvus (*Candida albicans*).