

FARM Lactic Conc

Koncentruotas vilgiklis su pieno rūgštimi ir jodu spenių sveikatinimui ir higienai palaikyti, naudojamas po melžimo, pritaikytas išpurškimo sistemoms.

FARM Lactic Conc – koncentruotas tirpalas, skirtas melžiamų gyvūnų tešmens priežiūrai ir spenių kanalėlių uždarymui. Dvi veikliosios medžiagos – pieno rūgštis ir aktyvus jodas – papildo viena kitą; glicerinas drėkina ir minkština spenių odą. Priemonė idealiai tinka naudoti purškimo būdu.

Paskirties gyvūnai:

Karvės ir kiti melžiami gyvūnai.

FARM Lactic Conc:

- ilgalaikė apsauga nuo mastitų, mažina somatinių ląstelių skaičių;
- sudaro plėvelę ant spenio ir uždaro angelę nuo aplinkoje esančių mastito patogenų;
- palaiko spenių odos drėgmę ir elastingumą;
- optimali formulė ir efektyvumas prieš platų mikroorganizmų spektrą;
- pastebimas gydomasis poveikis.

Produkto sudėtis

Pieno rūgštis, aktyvus jodas, glicerinas, plėvelę formuojanti medžiaga ir klampumą reguliuojanti medžiaga.

Naudojimo instrukcija

Naudojimo metodas	Darbinio tirpalo koncentracija	Skiedimo santykis	Skiedimo aprašymas
Vilgymo puodelis	minimali	1:5	1 l koncentrato atskiesti vandeniu iki 6 l.
	optimali	1:4	1 l koncentrato atskiesti vandeniu iki 5 l.
	maksimali	1:3	1 l koncentrato atskiesti vandeniu iki 4 l.
Apipurškimas	minimali	1:5	1 l koncentrato atskiesti vandeniu iki 6 l.
	optimali	1:4	1 l koncentrato atskiesti vandeniu iki 5 l.
	maksimali	1:3	1 l koncentrato atskiesti vandeniu iki 4 l.

Mirkymas: naudoti vilgiklį kambario temperatūros. Atskiestą tirpalą įpilti į spenių mirkymo indelį. Iškart po melžimo suvilgyti spenius (pamerkti į vilgiklį maždaug 2 – 5 cm arba visą spenį). Prieš kitą melžimą būtina nuskalauti ir nusausinti.

Išpurškimas: užpildyti purkštuvą arba automatinės purškimo sistemos talpą atskiestu tirpalu. Purkšti spenius iš karto po melžimo, tirpalas turi tolygiai ir nuosekliai padengti spenius. Prieš kitą melžimą būtina kruopščiai nuskalauti ir nusausinti.

Informacija apie saugų naudojimą

Įspėjimas: nepilti naudoto vilgiklio atgal į pakuotę. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti originalioje talpoje, sandariai uždarytas, vengti tiesioginių saulės spindulių bei staigių temperatūrinių

rėžimų pokyčių. Sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip +5°C temperatūra ir ne aukštesnė kaip +20°C temperatūra.

Išlauka

Netaikoma išlauka.

Pakuotė

Užsukami 20 L bakeliai, 200 L statinė bei 1 m³ konteineriai.

Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Neskaidri, ruda
Kvapaspas	Būdingas
pH, 100 %, 20-25°C	1,0 – 3,0
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,02 – 1,04

Galiojimo laikas

Geriausias 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Po atidarymo tinkamas naudoti 6 mėnesius.